

Tabelle 1: Risiko venöser oder arterieller Thromboembolien bei Unterbrechung der Antikoagulation (Beispiele nach⁷)

hohes Risiko	mittleres Risiko	geringes Risiko	
Jeder mechanische Klappenersatz in Mitralposition Klappenersatz mit „caged ball“ oder „tilting disc“ in Aortenposition Vorhofflimmern mit Insult/TIA vor < 3 Monaten oder mit CHADS ₂ -Score \geq 5 Rheumatische Klappenerkrankung Schwere Thrombophilien (Antithrombin-, Protein-C/S-Mangel) Antiphospholipid-Antikörper Venöse Thromboembolie vor < 3 Monaten	„Bileaflet“ Klappenersatz in Aortenposition mit weiteren Insultrisiken Vorhofflimmern mit CHADS ₂ -Score 3 oder 4 (außer Insult/TIA vor < 3 Monaten) Venöse Thromboembolie vor 3 bis 12 Monaten Rezidivierende venöse Thromboembolien Progressive Tumorerkrankung	„Bileaflet“ Klappenersatz in Aortenposition ohne weitere Insultrisiken Vorhofflimmern mit CHADS ₂ -Score 0-2, aber ohne Insult/TIA Venöse Thromboembolie vor > 12 Monaten	Warenzeichen in Österreich und Schweiz (Beispiele) Dalteparin: FRAGMIN (A, CH) Phenprocoumon: MARCOUMAR (A, CH)

Tabelle 2: Periprozedurales Risiko für schwere Blutungen (Beispiele nach⁷)

hohes Risiko	niedriges Risiko	
Herzklappenersatz; koronarer Bypass; Aortenaneurysma; Knie-/ Hüftersatz; neurochirurgische, rückenmarksnahe oder urologische OP; allgemein-/gefäßchirurgische OP > 45 Minuten; Polypektomie; Sphinkterotomie; Punktion abdomineller Organe	Haut-OP; vordere Augen-OP (Katarakt); Hernien-OP; Lymphknotenexstirpation; Schrittmacherimplantation; Zahnextraktionen; Hämorrhoiden-OP; Broncho-/gastrointestinale Endoskopie mit/ohne Biopsie; Angiografie; periphere Biopsie	Tranexamsäure: CYKLOKAPRON (A, CH)